



RESÚMENES DE LOS ARTÍCULOS

LA ARTERIA PULMONAR ES EL PRINCIPAL PRODUCTOR DE REACTANTES DE FASE AGUDA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

Estudio que compara la expresión de los niveles de reactantes de fase aguda en pacientes con EPOC y los fumadores sanos (controles), tanto en las arterias pulmonares locales como en leucocitos de sangre periférica y plasma. Los resultados señalan que la sobreexpresión de Amiloide Sérico A (AAS) en las arterias pulmonares en comparación con los leucocitos de sangre periférica sugiere que el pulmón puede ser la principal fuente de marcadores inflamatorios en pacientes con EPOC.

Rev Esp Patol Torac 2018; 30 (4) 216-223

POTENCIAL USO BIOMARCADOR DE LOS RETROTRANSPONES EN EL ADENOCARCINOMA DE PULMÓN

Retrotransposones como biomarcadores en el adenocarcinoma de pulmón.

Rev Esp Patol Torac 2018; 30 (4) 224-230

VARIABILIDAD DE LA PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA EN CONSULTAS EXTERNAS

Se presentan los resultados de la primera auditoría realizada en consultas externas de Neumología en 9 hospitales públicos de Andalucía. Se observa que la práctica clínica de los enfermos con EPOC muestra una gran variabilidad en la atención sanitaria no explicada sólo por las características clínicas de los pacientes

Rev Esp Patol Torac 2018; 30 (4) 236-243

DESHABITUACIÓN TABÁQUICA CON VARENICLINA SEGÚN DOSIS EN DISTINTAS PATOLOGÍAS

Vareniclina a dosis bajas y pautas cortas es eficaz, logrando tasas de abstinencia similares a la dosis estándar.

Las comorbilidades no influyen, salvo la EPOC (facilitadora para dejar el tabaco), el asma (dificultad para dejar de fumar) y una tendencia no significativa a favor de la dosis baja en ansiedad-depresión.

Rev Esp Patol Torac 2018; 30 (4) 244-253

PREVALENCIA DE LA EPOC EN EL ÁREA SANITARIA DE MÉRIDA EN LA POBLACIÓN DE 40 A 80 AÑOS EN EL 2015

El objetivo de este estudio es conocer la prevalencia de la EPOC en la población comprendida entre 40 y 80 años, en el Área Sanitaria de Mérida durante el 2015, mediante un estudio transversal, epidemiológico de base poblacional y descriptivo.

Rev Esp Patol Torac 2018; 30 (4) 254-262

