

RESÚMENES DE LOS ARTÍCULOS

HALLAZGOS BRONCOSCÓPICOS E HISTOLÓGICOS EN PACIENTES CON ASMA GRAVE NO CONTROLADA: SERIE DE CASOS RETROSPECTIVA

El AGNC sigue siendo un desafío pese a biomarcadores y biológicos. En 9 pacientes evaluados mediante fibrobroncoscopia, un tercio presentó aislamientos microbiológicos y las biopsias mostraron inflamación y alteraciones estructurales variables. Se observó una correlación positiva entre eosinófilos sanguíneos y tisulares, aunque sin significación estadística. El procedimiento permitió ajustes terapéuticos en 44,4%, mejorando la personalización del tratamiento.

Rev Esp Patol Torac 2026; 38 (3) 143-148

ECOGRAFÍA DIAFRAGMÁTICA EN ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA: UTILIDAD DEL GROSOR Y LA EXCURSIÓN EN LA CONSULTA DE SEGUIMIENTO Y SU RELACIÓN CON EL INICIO DE VENTILACIÓN NO INVASIVA

La ecografía diafragmática en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, especialmente el grosor diafragmático y la excursión, podría aportar información complementaria a las pruebas funcionales respiratorias convencionales en la visita de seguimiento en la que se valora el inicio de la ventilación mecánica no invasiva. Son necesarios estudios multicéntricos de validación.

Rev Esp Patol Torac 2026; 38 (3) 149-157

UTILIDAD Y RENTABILIDAD DEL LAVADO BRONCOALVEOLAR EN PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS HOSPITALIZADOS CON INFILTRADOS PULMONARES

El lavado broncoalveolar (LBA) demostró ser una herramienta segura y eficaz en 113 pacientes inmunodeprimidos con infiltrados pulmonares, alcanzando una rentabilidad diagnóstica del 57,5%. Permitted modificar el tratamiento antimicrobiano en el 85,8% de los casos, logrando su simplificación o suspensión en la mayoría, optimizando así el manejo clínico de estos pacientes.

Rev Esp Patol Torac 2026; 38 (3) 158-165

